

Avertissements agricoles



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 205 (13/91) du 11 JUILLET 1991

MAIS	: Risques pyrale très modérés dans les zones concernées
LUZERNE A GRAINES	: Surveiller les tychius.

MAIS

PYRALE

Situation

Le vol se poursuit et s'intensifie en cage à Poitiers. Les premières pontes sont observées dans le Nord-Vienne. Les principales zones à surveiller sont le Nord-Est des Deux-Sèvres et le Nord-Vienne.

Dans le Sud-Vienne, quelques rares parcelles, à proximité de semis direct de blé derrière maïs et de cribs présentent des risques.


Si le climat sec persiste au cours de la dernière quinzaine de Juillet, les risques même en zones concernées seront minimes.

Préconisation

- Charente, Charente Maritime et plaine de Niort : Rares seront les cas justifiant un traitement. Si nécessaire, intervenir autour du 20 Juillet.

- Vienne, Deux-Sèvres : Dans les zones concernées, intervenir si nécessaire autour du 25 Juillet.

Attention aux risques de pullulations de pucerons (*Rhopalosiphum Padi*) avec les pyrèthrinoides liquides.



CARTE PYRALE

PUCERONS

Situation

Régression des populations dû à la présence d'auxiliaires naturels.

P. 25



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tel. : 49 58 39 02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : J. P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous-régisseur de recettes Avertissements Agricoles

TOURNESOL

Stade : bouton étoilé de 1 cm de diamètre (parcelles très tardives) à pleine floraison.

PUCERONS

Situation

Stagnation ou régression des populations en liaison avec une présence importante des auxiliaires naturels.

Préconisation

Fin de risque, ne plus intervenir

SCLEROTINIA

Situation

La période sèche actuelle est favorable à l'arrêt de la progression du champignon dans les parcelles atteintes.

Préconisation

A partir du 20 Juin, aucune intervention fongicide n'a été utile.

LUZERNE A GRAINES

Stade : fin bourgeonnement à début de formation des gousses.

PUCERONS

Situation

Des pullulations très importantes mais localisées sont observées dans le Nord de la région et le Sud des Pays de Loire, liées à un vol de pucerons en cours.

Préconisation

Dans ces quelques situations, un traitement insecticide a du être ou doit être réalisé.

PHYTONOMES

Situation

Forte régression dans les parcelles suite au traitement. Seuls des adultes sont encore observables (sans incidence sur la culture).

Préconisation

Pas d'intervention spécifique.

TYCHIUS

Situation

Ce petit charançon (2,5 mm, de couleur jaune) est particulièrement préjudiciable car il dévore les graines.

Des niveaux préoccupants de captures sont notés en Charente-Maritime ainsi qu'en Vendée.

Préconisation

Une intervention est justifiée dans les zones concernées en cas de fortes captures quand les jeunes gousses se forment (stade sensible). Utiliser un produit à base de phosalone.

TORDEUSE

Situation

Le vol se poursuit sans être très important. Depuis que le stade sensible est atteint dans certaines parcelles (gousses vertes), le seuil d'intervention n'a pas encore été atteint. Toutefois, il sera probablement bientôt dépassé sur l'Ile d'Oléron.

Préconisation

Pas d'intervention pour l'instant, sauf en cas de pullulation de tychius.